

TRVALE VYŘAZENÍ:

Alergie:

Středně těžké a těžké nestabilizované alergické onemocnění

Závažná anafylaktická reakce v anamnéze

Alkoholismus a toxikománie:

Užívání injekčních drog v současnosti i v minulosti

Autoimunitní onemocnění:

Systémové choroby pojiva/ sklerodermie, SLE/

Systémové aktivní revmatické choroby / revmatoidní artritida aj. /

Sarkoidóza

CJD : v případě rodinného rizika

Diabetes mellitus:

Při léčbě inzulínem, nestabilizovaná léčba perorálními antidiabetiky

Hypertense:

Hypertenzní choroba III. st.

Imunitní onemocnění:

Závažně probíhající, chronické nebo recidivující onemocnění

Zvýšené riziko infekce:

Nitrožilní užívání drog/ v současnosti i minulosti/ a stálí sexuální partneři uživatelů i.v. drog

Muži a ženy, které provozují prostituci a jejich stálí sexuální partneři

Osoby, které mezi léty 1980 – 1996 pobývaly celkem 12 měsíců a déle ve VB nebo ve Francii

Osoby v úzkém kontaktu v HIV/AIDS / stálí sexuální partneři

Stálí sexuální partneři nemocných s prokázaným nosičstvím HCV a HBV

Infekční onemocnění u dárce

Boreliosa – chronická infekce

HIV

HTLV I/II

TBC mimoplicní

Tropické, u nás neobvyklé choroby/ baberiosa, Chagasova choroba, leishmanióza, chronická Q- horečka i v anamnéze a další

Virová hepatitida B, virová hepatitida C

Jaterní onemocnění

Závažně probíhající, chronické nebo recidivující onemocnění

Chronické choroby jater / fibrosa, cirhosa/

Srdeční onemocnění

Hypertensní choroba III.stadia, ICHS – stp. IM, sy anginy pectoris, srdeční nedostatečnost, závažné poruchy rytmu, hemodynamické závažné chlopňové vady, kardiomyopathie, myokarditida, endokarditida, arteriální trombosa, opakovaná žilní trombosa, MCP

Kolapsové stavy

Opakované kolapsové stavy, a to i při odběrech

Kožní choroby

Generalizované chronické zánětlivé, alergické, nádorové a degenerativní onemocnění

Ekzém při rozsáhlém postižení nebo postižení místa vpichu

Krevní choroby

Závažně probíhající, chronické nebo se opakující onemocnění

Krvácivé choroby / hemofilie či jiná chronická koagulační porucha/

Těžké poruchy krvevorbny

Primární polycytemie

Trombofilní stav a žilní trombosa v anamnéze- vyloučení z přístrojových odběrů

LÉKY viz tabulka u dočasného vyřazení

Trvale : přípravky z lidské hypofýzy/růstový hormon/

- Na akné etretinat
- Dlouhodobé užívání psychofarmak
- Léky i.v. a i.m. aplikované, nepředepsané lékařem

Další závažné důvody k trvalému vyřazení:

Onemocnění močových cest- nefritida, pyelonefritida, nefróza, polycystóza ledvin, selhání ledvin

Nádorová onemocnění – maligní

Onemocnění nervové soustavy- organická onemocnění, závažná onemocnění CNS, opakované celkové křečové stavy

Oční onemocnění- závažný nález na očním pozadí, chronické záněty rohovky, cévnatky, retinopathie, zánět zřakového nervu

Operace - operační výkony s trvalými následky na krvevorbny, neurochirurgické operace s použitím dura mater

Plicní onemocnění- závažné chronické a opakující se onemocnění, emfyzém, těžká chronická bronchitida, těžké fibrotické změny plicní

Povolání : trvale jsou vyloučení vojenští piloti v aktivní službě, zaměstnanci infekčního nebo plicního oddělení nemocnice

Psychiatrická onemocnění- psychóza, demence, těžší oligofrenie

Onemocnění štítné žlázy – při významných poruchách funkce

Transplantace- příjemci xenotransplantátu, transplantace dura mater, rohovkový štěp, skleroplastika, ušní bubínek

Trávicí trakt- ulcerosní kolitida, Crohnova choroba, stav po resekci žaludku nebo rozsáhlé resekci střev, chronická choroba jater, slinivky

DŮVODY DOČASNÉHO VYŘAZENÍ / DOBA VYŘAZENÍ

Akupunktura – 6 měsíců, pokud byla provedena jinde než ve zdravotnickém zařízení / tj. kromě provedení kvalifikovaným personálem a sterilními jehlami na jedno použití/

Alergie – pylová alergie, senná rýma - vyloučení ve fázi akutních projevů.
Alergie na léky - vyloučení ve fázi projevů.

Alkoholismus a toxikomanie – osoby, které jeví známky opilosti

Závislost na alkoholu či drogách : 12 měsíců po vyléčení a s průkazem abstinence

Pohlavní styk s uživatelem/ užívatelkou injekčních drog 12 měsíců

CJD a její varianty / vCJD = BSE a TSE/ - **trvale**

Pobyt ve VB a Francii / déle než 6 měsíců/ v letech 1980-1996 / teoretické riziko variantní CJD/ a podání transfuze ve VB po roce 1980 – **trvale**

Dárcovství krvetvorných buněk, oocytů :

Odběr vzorků potencionálního dárce kostní dřeně pro konfirmační HLA vyšetření 3 měsíce / nebo do vyřazení dárce z aktuálního čekacího listu potencionálního dárce/

Odběr kostní dřeně nebo krvetvorných buněk 6 měsíců

Dárcovství oocytů 1 měsíc po ukončení hormonální stimulace

Endoskopie - endoskopické vyšetření žaludku, střev, dýchacího ústrojí a močových cest/ **6 měsíců**

Infekce:

Návštěva rizikových oblastí v době výskytu Západonilské horečky, SARS, horečky Dengue **28 dnů po návratu**

Pobyt mimo Evropu **4 týdny** od návratu

Malarická oblast : pokud nebyly příznaky onemocnění **6 měsíců** po návratu

Pobyt v tropech a v malarické oblasti s febrilní atakou **3 roky** od poslední návštěvy

Další:

Pokud u dané infekce není známa inkubační doba **4 týdny**

Akutní či nově diagnostikovaná hepatitida B,C u člena domácnosti či sexuálního partnera **6 měsíců**

Klíště **4 týdny** pokud nejsou příznaky onemocnění

Krvavé poranění nebo potřísnění krví – potencionálně infekčním materiálem t.j. krev cizí osoby **6 měsíců**

Imunizace anti-D **6 měsíců** po poslední imunizaci erytrocyty

Pobyt v nápravném zařízení/ vězení/ **6 měsíců**

Pohlavní styk s osobou provozující prostituci - doporučeno **12 měsíců** od posledního pohlavního styku

Pohlavní styk s osobou HIV pozitivní či nemocnou AIDS **12 měsíců**

Pohlavní styk s nemocným nebo nosičem hepatitidy B,C doporučeno **12 měsíců**

Pohlavní styk mezi muži a jejich sexuálními partnerkami doporučeno **12 měsíců**

Střídání náhodných sexuálních partnerů, skupinový sex **6 měsíců**

Potencionální dárce se vylučuje po infekční chorobě alespoň na **2 týdny** po datu úplného klinického uzdravení

Ale u těchto infekcí jsou tyto doby vyloučení po uzdravení

Akutní infekce, chřipka, horečka nad 38 st C / po skončení léčby, vysazení ATB, a odeznění příznaků/ **2 týdny**

Listerióza, tularemie, brucelóza **2 roky**

Borelióza **6 měsíců**

Břišní tyfus a paratyfus **1 rok**

Hepatitida A,E **1 rok po uzdravení**

Horečka Q **2 roky**

Infekční mononukleóza **1 rok**

Kapavka **1 rok / považováno za rizikové chování/**

Klíšťová encefalitida **1 rok**

Malárie viz výše

Sepse **1 rok**

Syfyilis **1 rok** následující po potvrzeném vyléčení

Toxoplazmóza **6 měsíců**

TBC **2 roky**

Katetrizace- použití cévních katetrů **6 měsíců**

Léky - je doporučeno vyloučení na dobu alespoň dvou biologických poločasů

Prosíme kontaktovat transfuzní stanici a informovat se na dobu vyloučení od vysazení léku.

Pozor trvale jsou vyloučení potencionální dárce léčení přípravky lidského původu – růstový hormon

Močové cesty – glomerulonefritida akutní **12 měsíců** po úplném uzdravení

Očkování - TBC, žlutá zimnice, příušnice, zarděnky, spalničky, poliomyelitida, tyfus, cholera **4 týdny**, pokud jde o očkování s oslabenými viry či bakteriemi

Neštovice - 8 týdnů

Doporučujeme kontaktovat transfuzní stanici.

Operace - výkony v lokální anestezii **1-3 týdny** podle charakteru zákroku

Operace v celkové anestezii **6 měsíců**

Revmatická horečka - **2 roky** po poslední atace, pokud nejsou přidružena jiná onemocnění např. srdce, pak je vyloučení **trvale**

Sádrová fixace – až po **odstranění** sádrové dlahy či obvazu

Stomatologické výkony - extrakce zubu **1 týden**

Transfuze - podání transfuzního přípravku **6 měsíců** / v případě podání transfuzního přípravku v zahraničí před rokem 1996 – **trvale/**

Transplantace - transplantace buněk nebo tkání lidského původu / včetně kostních štěpů/ **6 měsíců**

Transplantace tvrdé pleny, bubínku a rohovky **-trvale**

Transplantace s použitím zvířecího štěpu – **trvale**

Tetování, body piercing, propíchnutí ušního boltce, permanentní make up

6 měsíců

Těhotenství - **6 měsíců** neurčí-li lékař jinak, tj. po delší době zpravidla následuje kojení